

## МАТЭМАТЫКА

УДК 517.926.4+517.928.2

М. В. КАРПУК

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ СТАРШЕГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЛЯПУНОВА ЛИНЕЙНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ПАРАМЕТРОМ-МНОЖИТЕЛЕМ

*Институт математики Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,  
e-mail: m.vasilitch@gmail.com*

Для семейства  $dx/dt = \mu A(t)x$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $t \geq 0$ , линейных  $n$ -мерных дифференциальных систем с кусочно-непрерывной матрицей  $A(t)$ ,  $t \geq 0$ , и вещественным параметром  $\mu$  получено для любого натурального  $n$  полное описание старшего показателя Ляпунова его систем, рассматриваемого как функция параметра  $\mu$ . Доказано, что функция  $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  является старшим показателем Ляпунова некоторого такого семейства, если и только если она удовлетворяет четырем условиям: 1) принадлежит бэровскому классу  $(*, G_\delta)$ ; 2) равна нулю в нуле; 3) неотрицательна на некоторой полуоси; 4) если она не равна тождественно  $+\infty$  ни на одной из открытых полуосей, то существует действительное число  $b$  такое, что неравенство  $f(\mu) \geq b\mu$  выполняется при всех  $\mu \in \mathbb{R}$ .

*Ключевые слова:* линейные дифференциальные системы, параметр-множитель, показатели Ляпунова, бэровский класс.

M. V. KARPUK

### DESCRIPTION OF THE LARGEST LYAPUNOV EXPONENT OF LINEAR DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH A PARAMETER-MULTIPLIER

*Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus,  
e-mail: m.vasilitch@gmail.com*

The largest Lyapunov exponents of linear differential systems  $dx/dt = \mu A(t)x$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $t \geq 0$ , with the real parameter-multiplier  $\mu$  are considered. It is proven that a function  $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  is the largest Lyapunov exponent of some linear differential system with a real parameter-multiplier if and only if it fits the next four conditions: 1) it belongs to the  $(*, G_\delta)$  Baire class; 2) it vanishes at zero; 3) it is nonnegative on some real semi-axis; 4) if it is not identically equal to  $+\infty$  on any real semi-axis, then there exists such a real number  $b$  that the inequality  $f(\mu) \geq b\mu$  holds for all  $\mu \in \mathbb{R}$ .

*Keywords:* linear differential systems, parameter-multiplier, Lyapunov exponents, Baire class.

**Введение.** Рассмотрим  $n$ -мерную линейную систему дифференциальных уравнений

$$dx/dt = A(t)x, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n, \quad t \geq 0, \quad (1)$$

матрица коэффициентов  $A(\cdot): [0, +\infty) \rightarrow \text{End } \mathbb{R}^n$  которой кусочно-непрерывна на временной полуоси  $t \geq 0$ . Класс всех таких систем обозначим через  $\mathcal{M}_n^*$ . Отождествляя систему (1) и ее матрицу коэффициентов, будем писать  $A \in \mathcal{M}_n^*$ . Наряду с системой (1) рассмотрим порожденное ею однопараметрическое семейство

$$dx/dt = \mu A(t)x, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n, \quad t \geq 0, \quad (2)$$

линейных дифференциальных систем со скалярным параметром-множителем  $\mu \in \mathbb{R}$ . Класс семейств (2), порождаемых системами  $A \in \mathcal{M}_n^*$ , обозначим через  $\mathcal{K}_n^*$ . Фиксируя в семействе (2)

значение параметра  $\mu$ , получаем линейную дифференциальную систему, которую обозначаем через  $\langle \mu \rangle_A$ . Через  $\lambda_1(\mu A) \leq \dots \leq \lambda_n(\mu A)$  обозначим показатели Ляпунова [1, с. 34; 2, с. 63] системы  $\langle \mu \rangle_A$ .

Меры множеств  $S_\sigma(\mu A)$ , составленных из наборов  $(\lambda_1(\mu(A+Q)), \dots, \lambda_n(\mu(A+Q)))$  показателей Ляпунова, при отделенных от нуля положительных значениях параметра  $\mu$  и всех матрицах-возмущениях  $Q(\cdot)$ , удовлетворяющих оценке  $\|Q(t)\| \leq \text{const}_Q \exp(-\sigma t)$ , исследовались в работах [3, 4]. В них установлено существование систем (2) с множествами  $S_\sigma(\mu A)$  положительной меры Лебега, неограниченной по параметру  $\mu$ . В работе [5] получено необходимое и достаточное условие на матрицу-возмущение  $Q(\cdot)$ , при котором наборы показателей Ляпунова исходной ( $Q(\cdot) \equiv 0$ ) и возмущенной систем совпадают.

В. И. Зубов в монографии [6, с. 408; проблема 1] поставил задачу выяснить, как изменяются показатели Ляпунова системы (1) после умножения на постоянную вещественную величину  $\mu$  всех ее коэффициентов, т. е. как связаны показатели Ляпунова систем (1) и (2). Подчеркнем, что в [6] в постановке задачи ограниченности матрицы коэффициентов системы (1) не предполагается. Поэтому, вообще говоря, показатель  $\lambda_i(\mu A)$ ,  $i = 1, \dots, n$ , может при некоторых или всех значениях  $\mu$  принимать несобственные значения:  $-\infty$  или  $+\infty$ . Следовательно, функция  $\lambda_i(\mu A)$  переменной  $\mu \in \mathbb{R}$ , которую назовем  $i$ -м показателем Ляпунова семейства (2), – это функция  $\mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , где  $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \sqcup \{-\infty, +\infty\}$ .

Задача Зубова равносильным образом может быть сформулирована так: для каждого  $i = 1, \dots, n$  дать полное описание множества  $\mathcal{L}_i^n = \{\lambda_i(\mu A) : A \in \mathcal{M}_n^*\}$  функций  $\mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , представляющих собой  $i$ -е показатели Ляпунова семейств из  $\mathcal{K}_n^*$ . В настоящей работе эта задача решена для старших показателей Ляпунова  $\lambda_n(\mu A)$ , т. е. для каждого натурального  $n \geq 2$  дано полное описание множества  $\mathcal{L}_n^n$ .

Отметим, что случай  $n = 1$  тривиален. Пусть  $A(\cdot) : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , а  $\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \int_0^t A(\tau) d\tau = \overline{A}$  и  $\underline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \int_0^t A(\tau) d\tau = \underline{A}$ . Тогда, очевидно,  $\lambda_1(\mu A) = \mu \overline{A}$ , если  $\mu > 0$ , и  $\lambda_1(\mu A) = -\mu \underline{A}$ , если  $\mu < 0$ , кроме того,  $\lambda_1(0) = 0$ . Поскольку для любых значений  $\underline{A}$ ,  $\overline{A} \in \overline{\mathbb{R}}$ , таких, что  $\underline{A} \leq \overline{A}$ , найдется [2, с. 149] функция  $A(\cdot) : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ , нижние и верхние интегральные средние которой совпадают с этими значениями соответственно, то класс  $\mathcal{L}_1^1$  состоит из всех функций  $f(\cdot) : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , равных нулю в нуле, таких, что их сужение на открытую полуось – линейная однородная функция (возможно, равная  $-\infty$  или  $+\infty$ ) и  $-f(-1) \leq f(1)$ .

**Необходимые определения и предварительные результаты.** Для  $q \in \mathbb{R}$  множество Лебега  $f^{-1}([q, +\infty))$  вещественнозначной функции  $f$  (т. е. прообраз промежутка  $[q, +\infty)$  при отображении  $f$ ), будем, следуя [7, с. 221], обозначать через  $[f \geq q]$ . Напомним, что вещественнозначная функция  $f$  называется [7, с. 223–224] функцией класса  $(*, G_\delta)$ , если для каждого  $q \in \mathbb{R}$  ее множество Лебега  $[f \geq q]$  является  $G_\delta$ -множеством (множество в топологическом пространстве называется  $G_\delta$ -множеством, если оно представимо в виде счетного пересечения открытых в этом пространстве множеств). Считаем, что на расширенной числовой прямой  $\overline{\mathbb{R}}$  задана естественная порядковая топология, т. е.  $\overline{\mathbb{R}}$  гомеоморфно отрезку  $[-1, 1]$ . Введем ограничивающее преобразование  $\ell : \overline{\mathbb{R}} \rightarrow [-1, 1]$  стандартным образом:

$$\ell(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|+1} & \text{при } x \in \mathbb{R}, \\ \text{sgn}(x) & \text{при } x = \pm\infty. \end{cases}$$

Поскольку отображение  $\ell$  осуществляет сохраняющий порядок гомеоморфизм между  $\overline{\mathbb{R}}$  и отрезком  $[-1, 1]$ , то скажем, что функция  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  принадлежит бэровскому классу  $\mathcal{K}$ , если этому же классу  $\mathcal{K}$  принадлежит и композиция  $\ell \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (это определение равносильно определению [8, с. 382, 401] бэровских классов функций для отображений метрических пространств). В частности, ска-

жем, что функция  $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  принадлежит классу  $(*, G_\delta)$ , если этому классу принадлежит композиция  $\ell \circ f$ .

В теореме 3 работы [9] доказано, что для каждой системы  $A \in \mathcal{M}_n^*$  функция  $\lambda_n(\mu A): \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  аргумента  $\mu$  удовлетворяет следующим трем необходимым условиям: а) она принадлежит классу  $(*, G_\delta)$ ; б) обращается в нуль в нуль; в) принимает на одной из числовых полуосей только неотрицательные значения. Рассмотрим функцию  $\lambda_n(\mu A)$  на той открытой полуоси, на которой она неотрицательна. Могут представиться только две возможности: 1) либо функция  $\lambda_n(\mu A)$  принимает на этой полуоси хотя бы одно конечное значение; 2) либо на этой полуоси функция  $\lambda_n(\mu A)$  тождественно равна  $+\infty$ . В [9, теорема 3] доказано, что если имеет место случай 1), то функция  $\lambda_n(\mu A)$  удовлетворяет еще одному необходимому условию: г) найдется такое число  $b \in \mathbb{R}$ , что при всех  $\mu \in \mathbb{R}$  верно неравенство  $\lambda_n(\mu A) \geq b\mu$ . В [9, теорема 4] доказано, что в случае 1) необходимые условия а) – г) являются и достаточными, т. е. для любой функции  $f(\cdot): \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , удовлетворяющей условиям а) – г), существует такая система  $A \in \mathcal{M}_n^*$ , что старший показатель Ляпунова семейства (2) совпадает с  $f(\mu)$  при всех  $\mu \in \mathbb{R}$ . Вопрос о полном описании старшего показателя Ляпунова в случае 2) оставался открытым.

В настоящей работе доказано (в этом и состоит ее основной результат), что в случае 2) необходимые условия а) – в) являются также и достаточными. Этим с учетом результатов работы [9] задача Зубова для старшего показателя Ляпунова  $\lambda_n(\mu A)$  решена полностью.

**Основные результаты.** В силу вышесказанного множество старших показателей Ляпунова тех семейств (2), для которых они тождественно равны  $+\infty$  на одной из полуосей, полностью описывает

**Т е о р е м а 1.** Для каждого натурального  $n \geq 2$  и любой функции  $f: \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  класса  $(*, G_\delta)$ , обращающейся в нуль в нуль и тождественно равной  $+\infty$  на одной из открытых полуосей, существует такая система  $A \in \mathcal{M}_n^*$  с бесконечно дифференцируемой матрицей коэффициентов, что старший показатель Ляпунова  $\lambda_n(\mu A)$  системы  $\langle \mu \rangle_A$  равен  $f(\mu)$  при всех  $\mu \in \mathbb{R}$ .

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Не ограничивая общности, считаем, что функция  $f$  неотрицательна на положительной полуоси, поскольку очевидно, что если  $\lambda_n(\mu A) = f(\mu)$ , то  $\lambda_n(\mu(-A)) = f(-\mu)$ ,  $\mu \in \mathbb{R}$ . Для доказательства теоремы нам понадобится ряд дополнительных построений, которые будем выписывать как его отдельные пункты.

**1.** Построим вначале двумерную систему, удовлетворяющую условиям теоремы. Для ее построения нам понадобится несколько модифицировать конструкцию работ [10, 11]. Опишем эту конструкцию вместе с нужными нам изменениями. Зафиксируем какие-либо кусочно-непрерывные  $2 \times 2$ -матрицу  $B(\cdot)$  и функцию  $\omega(\cdot)$  и возьмем матрицу  $A(\cdot)$  системы (1), где  $n = 2$ , в виде:

$$A(t) = U^{-1}(t)B(t)U(t) - U^{-1}(t)dU(t)/dt, \quad t \geq 0, \quad (3)$$

здесь  $U(t)$  – матрица поворота на угол  $\varphi(t) = \int_0^t \omega(\tau) d\tau$  по ходу часовой стрелки (не нарушая общности, считаем ортонормальную систему координат  $Ox_1x_2$  правой). Сделав в семействе (2) с матрицей  $A(\cdot)$ , задаваемой равенством (3), линейную замену переменных  $y = U(t)x$ , придем, как легко убедиться, к следующему семейству:

$$dy/dt = \mu B(t)y + (1 - \mu)\omega(t) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} y \equiv C_{B,\omega}(t,\mu)y, \quad y \in \mathbb{R}^2, \quad t \geq 0. \quad (4)$$

Так как матрица  $U(t)$  является при каждом  $t \geq 0$  ортогональной, то замена переменных  $y = U(t)x$  не изменяет норму решений, а значит, для любого  $\mu \in \mathbb{R}$  показатели Ляпунова системы  $\langle \mu \rangle_A$  семейства (2) с матрицей (3) и системы  $\langle \mu \rangle_C$  семейства (4) совпадают. Таким образом, построение нужной двумерной системы (1) сводится к построению соответствующих матрицы  $B(\cdot)$  и функции  $\omega(\cdot)$ . Эти матрица  $B(\cdot)$  и функция  $\omega(\cdot)$  будут определены в п. 5 доказательства после некоторых дополнительных вспомогательных построений п. 2 и 3.

2. Матрицу  $C_{B,\omega}(\cdot; \mu)$  семейства (4) (т. е. матрицу  $B(\cdot)$  и функцию  $\omega(\cdot)$ ) будем строить на временной полуоси  $t \geq 0$  как кусочно-постоянную, значения которой составлены из элементов определяемого ниже семейства матриц.

Рассмотрим следующее четырехпараметрическое семейство  $2 \times 2$ -матриц:

$$D(\mu; p) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \mu a & \mu(b-c) + c \\ \mu(d+c) - c & \mu a \end{pmatrix}, \quad (5)$$

зависящее от четырех вещественных параметров  $a, b, c, d$  (обозначим составленный из них вектор  $(a, b, c, d)^T$  через  $p$ ) и переменной  $\mu \in \mathbb{R}$ . Для матрицы  $D(\mu; p)$  ее характеристическое уравнение  $\det(vE - D(\mu; p)) = 0$  имеет вид  $(v - \mu a)^2 - (\mu(b-c) + c)(\mu(d+c) - c) = 0$ . Дискриминант  $R(\mu; p)$  этого уравнения равен  $R(\mu; p) = 4((b-c)(d+c)\mu^2 + c(2c+d-b)\mu - c^2)$ .

Для вещественных чисел  $r$  и  $s$  ( $r < s$ ) одного знака (в частности, ненулевых) компоненты вектора  $p$  выберем удовлетворяющими условиям:

$$a > 0, \quad c \geq 0, \quad b = c(s-1)/s, \quad d = c(1-r)/r. \quad (6)$$

При таком, как в (6), выборе параметров  $a, b, c, d$  корнями квадратного относительно  $\mu$  трехчлена  $R(\mu; p)$  являются числа  $r$  и  $s$ , его старший коэффициент равен  $4(b-c)(d+c) = -4c^2/(rs) < 0$ , а характеристические числа  $v_{1,2}(\mu)$  матрицы  $D(\mu; p)$  задаются, как нетрудно найти, равенством  $v_{1,2}(\mu) = a\mu \pm c\sqrt{(s-\mu)(\mu-r)/(rs)}$ . Поэтому корни  $v_{1,2}(\mu)$  вещественны только при  $\mu \in [r, s]$ , а при всех  $\mu$ , не принадлежащих отрезку  $[r, s]$ , вещественная часть обоих характеристических чисел  $v_1(\mu)$  и  $v_2(\mu)$  равна  $a\mu$ . Так как  $c \geq 0$ , то для нахождения большего характеристического числа (пусть это  $v_2$ ) при  $\mu \in [r, s]$  в последнем равенстве нужно взять знак «плюс», т. е. при  $\mu \in [r, s]$  имеет место равенство  $v_2(\mu) = a\mu + c\sqrt{(s-\mu)(\mu-r)/(rs)}$ ; в частности,  $v_2(\mu) \geq a\mu$  при всех  $\mu \in [r, s]$ .

Рассмотрим вещественную часть  $\text{Re } v_2(\mu)$  большего характеристического числа  $v_2(\mu)$  как функцию аргумента  $\mu \in \mathbb{R}$  и обозначим эту функцию через  $v(\mu)$ , т. е.

$$v(\mu) = \begin{cases} a\mu + c\sqrt{(s-\mu)(\mu-r)/(rs)} & \text{при } \mu \in [r, s], \\ a\mu & \text{при } \mu \in \mathbb{R} \setminus [r, s]. \end{cases} \quad (7)$$

Покажем, что максимум этой функции на отрезке  $[r, s]$  достигается в точке

$$\mu_{\max} = \xi + L\sqrt{a^2rs/(c^2 + a^2rs)}, \quad (8)$$

где  $\xi = (s+r)/2$  и  $L = (s-r)/2$ . Действительно, сделаем замену переменной (сдвиг)  $\mu = \omega + \xi$ ; тогда, поскольку  $\mu \in [r, s]$ , переменная  $\omega \in [-L, L]$ , а функция  $v(\mu)$  при такой замене перейдет в функцию  $\gamma(\omega) = a\xi + a\omega + c\sqrt{L^2 - \omega^2}/\sqrt{rs}$ . Очевидно, что равенство  $d\gamma(\omega)/d\omega = 0$  равносильно равенству  $\omega/\sqrt{L^2 - \omega^2} = a\sqrt{rs}/c$ . Корень последнего уравнения положителен и, как легко убедиться, равен  $L\sqrt{a^2rs/(c^2 + a^2rs)}$ , откуда обратной заменой получаем равенство (8). Из проведенных вычислений видно, что на отрезке  $[r, s]$  функция  $v(\mu)$  возрастает при  $\mu \in [r, \mu_{\max}]$  и убывает при  $\mu \in [\mu_{\max}, s]$ .

Обозначим для удобства число  $\sqrt{a^2rs/(c^2 + a^2rs)}$  через  $h$ ; в этих обозначениях формула (8) примет вид  $\mu_{\max} = \xi + Lh$ . Учитывая очевидное включение  $h \in (0, 1]$ , из формулы (8) получаем, что  $\mu_{\max} \in (\xi, s]$ . Подставив вместо  $\mu$  значение  $\mu_{\max}$  в первое выражение из (7), после очевидных преобразований находим, что максимальное значение  $v_{\max}$  функции  $v(\cdot)$  на отрезке  $[r, s]$  равно

$$v_{\max} = a\xi + aL/h. \quad (9)$$

Пусть задано некоторое число  $\varepsilon > 0$ , удовлетворяющее неравенству

$$\varepsilon < a\xi + aL/h - as = aL(1-h)/h. \quad (10)$$

Обозначим  $q = v_{\max} - \varepsilon$ . В силу неравенства (10) и того, что на отрезке  $[r, s]$  функция  $v(\mu)$  возрастает при  $\mu \in [r, \mu_{\max}]$  и убывает при  $\mu \in [\mu_{\max}, s]$ , множество тех  $\mu \in [r, s]$ , в которых значения функции  $v(\cdot)$  отличаются от ее максимального значения  $v_{\max}$  не более, чем на  $\varepsilon$ , является отрезком. Чтобы найти его концы, т. е. те два значения  $\delta$ , при которых точки  $\mu_{\max} + \delta$  принадлежат отрезку  $[r, s]$  и выполняется равенство  $v(\mu_{\max} + \delta) = q$ , подставим в первое выражение из (7), записанное в виде  $v(\mu) = a\xi + a(\mu - \xi) + c\sqrt{L^2 - (\mu - \xi)^2} / \sqrt{rs}$ , вместо переменной  $\mu$  значение  $\mu_{\max} + \delta$ , получим равенство

$$v(\mu_{\max} + \delta) = a\xi + a(\delta + Lh) + c\sqrt{L^2 - (\delta + Lh)^2} / \sqrt{rs}.$$

Приравнивая правые части последнего равенства и равенства (9):  $v_{\max} - \varepsilon = a\xi + aL/h - \varepsilon$ , получим уравнение  $a(\delta + Lh) + c\sqrt{L^2 - (\delta + Lh)^2} / \sqrt{rs} = aL/h - \varepsilon$ , или, после преобразований,

$$(L^2 - (\delta + Lh)^2)c^2 / (rs) = (aL/h - aLh - a\delta - \varepsilon)^2.$$

Раскрывая скобки и собирая члены при одинаковых степенях  $\delta$ , а также учитывая, что  $c^2 / (rs) = a^2(1-h^2)/h^2$ , придем к квадратному относительно  $\delta$  уравнению

$$(a^2/h^2)\delta^2 + 2a\varepsilon\delta + \varepsilon^2 - 2\varepsilon aL(1-h^2)/h = 0. \quad (11)$$

Дискриминант  $D$  уравнения (11) равен:  $D = (4\varepsilon a^2(1-h^2)/h^2)(2aL/h - \varepsilon)$ . В силу неравенства (10), поскольку  $2aL/h > (aL/h)(1-h)$ , дискриминант  $D$  положителен. Кроме того, так как  $\varepsilon < (aL/h)(1-h) < (2aL/h)(1-h^2)$ , то свободный член квадратного трехчлена в (11) отрицателен, а значит, корни  $\delta_{1,2}$  уравнения (11) разного знака (не ограничивая общности, считаем  $\delta_1 < 0 < \delta_2$ ). Таким образом, множеством решений неравенства  $v(\mu) \geq q$  на отрезке  $[r, s]$  является отрезок  $[\mu_{\max} + \delta_1, \mu_{\max} + \delta_2]$ .

В дальнейшем мы будем применять конструкцию этого пункта следующим образом: по заданным значениям  $r, s, a, q, \varepsilon$  из равенства  $v_{\max} = q + \varepsilon$  найдем вследствие (9) коэффициент  $c$ , затем из двух последних равенств в (6) – коэффициенты  $b$  и  $d$ ; тогда определен вектор  $p = (a, b, c, d)^T$ , а значит, матрица (5) и функция  $v(\cdot)$ , про которую будем говорить, что она построена на отрезке  $[r, s]$  по числам  $a, q, \varepsilon$ .

**3.** В этом пункте определим отрезки, на которых будем строить нужные нам функции  $v(\cdot)$  из п. 2.

**3.1.** Воспользуемся полученным в [12] представлением множеств Лебега функций класса  $(*, G_\delta)$ . Функция  $f$  класса  $(*, G_\delta)$ , как и любая вещественнозначная функция, однозначно определяется [7, с. 221] своими множествами Лебега  $[f \geq q_w]$ , где  $\{q_w : w \in \mathbb{N}\}$  – множество рациональных чисел, занумерованных каким-либо образом. Так как  $f$  – функция класса  $(*, G_\delta)$ , то для каждого  $q \in \mathbb{R}$  ее множество Лебега  $[f \geq q]$ , являясь  $G_\delta$ -множеством, представимо в виде счетного пересечения открытых множеств. Для всех  $q_w, w \in \mathbb{N}$ , выберем это представление таким же, как в работах [9, 12], т. е. таким, чтобы выполнялась

Л е м м а [12]. Для любой функции  $f \in (*, G_\delta)$  существует семейство  $\{(G_w^i)_{i \in \mathbb{N}} : w \in \mathbb{N}\}$  убывающих последовательностей  $(G_w^i)_{i \in \mathbb{N}}$  открытых множеств такое, что при всех  $w \in \mathbb{N}$  верно представление  $[f \geq q_w] = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} G_w^i$ , и каждая точка  $\mu \in \mathbb{R}$ , не принадлежащая множеству  $[f \geq q_w]$ , принадлежит не более чем конечному количеству тех множеств  $G_j^i, i \in \mathbb{N}$ , для нижнего индекса  $j$  которых выполнено неравенство  $q_j \geq q_w$ .

**3.2.** Поскольку, как сказано в начале доказательства, справедливы равенства  $f \equiv +\infty$  на  $(0, +\infty)$  и  $f(0) = 0$ , то далее вместо  $f$  достаточно рассматривать ее сужение  $f|_{(-\infty, 0)}$  на полуось  $(-\infty, 0)$ . Так как  $[f|_{(-\infty, 0)} \geq q] = [f \geq q] \cap (-\infty, 0)$ , то множества  $G_w^i$  из леммы, дающие представление множеств Лебега  $[f|_{(-\infty, 0)} \geq q]$ , являются подмножествами интервала  $(-\infty, 0)$  для всех  $(w, i) \in \mathbb{N}^2$ . Построим теперь нужное в дальнейшем представление самих открытых множеств  $G_w^i$ . Каждое множество  $G_w^i$ , являясь открытым подмножеством интервала  $(-\infty, 0)$ , представляет собой не более чем счетное объединение  $G_w^i = \sqcup_{k \in \mathbb{N}} I_w^i(k)$  непересекающихся интервалов  $I_w^i(k)$ , лежащих на полуоси  $(-\infty, 0)$ .

Зафиксируем какую-либо функцию  $\varepsilon(w, i)$  такую, что  $\varepsilon(w, i) \rightarrow 0$  при  $|w| + |i| \rightarrow +\infty$ , например,  $\varepsilon(w, i) = (w^2 + i^2)^{-1}$ . Рассмотрим отдельно каждый интервал  $I_w^i(k)$ . Если этот интервал конечен, то определены числа  $r, s, q, \varepsilon$ , а именно,  $I_w^i(k) = (r, s)$ ,  $q = q_w$  и  $\varepsilon = \varepsilon(w, i)$ , которые до конца этого подпункта 3.2 будем писать, не отмечая их зависимость от  $w$  и  $w, i$ . Выберем на интервале  $(r, s)$  два семейства отрезков

$$\Delta_w^i(k, -l) = [r + 2^{-l-1}L, r + 2^{-l}L] \quad \text{и} \quad \Delta_w^i(k, l) = [s - 2^{-l}L, s - 2^{-l-1}L], \quad l \in \mathbb{N},$$

где, как и выше,  $L = (s - r) / 2$ . Если интервал  $I_w^i(k)$  бесконечен, т. е.  $I_w^i(k) = (-\infty, s)$ , то в этом случае семейства отрезков зададим так:

$$\Delta_w^i(k, -l) = [s - l - 1, s - l + 1 / 2] \quad \text{и} \quad \Delta_w^i(k, l) = [s - 2^{-l}, s - 2^{-l-1}], \quad l \in \mathbb{N},$$

а число  $L$  положим равным  $1 / 2$ . В дальнейшем случаи конечных и бесконечных интервалов  $I_w^i(k)$  различать не будем, так как построения этого подпункта будут верны для обоих случаев. Каждому отрезку  $\Delta_w^i(k, l)$ ,  $l \in \mathbb{Z}$ ,  $l \neq 0$ , поставим в соответствие число  $a = \max(w + i + k + l, [q / s] + 1)$ , где  $[q / s]$  – целая часть числа  $q / s$  (позднее нам понадобится условие  $q > as$  для того, чтобы для этого отрезка выполнялось неравенство (10)).

Покажем, что каждая точка  $\mu$  отрезка  $\Delta_w^i(k, l)$ ,  $l \neq 0$ , может быть точкой максимума какой-то функции  $v(\cdot)$ , построенной, как в п. 2, на некотором отрезке  $[r', s'] \subset I_w^i(k)$  по числам  $a, q, \varepsilon$ , причем  $v(\mu) = q + \varepsilon$  и расстояния от точек  $r'$  и  $s'$  до отрезка  $\Delta_w^i(k, l)$  не будут превышать  $2^{-l-2}L$  (расстояние от точки до множества – инфимум расстояний от нее до точек множества). Будем говорить, что указанный отрезок  $[r', s']$  реализует точку  $\mu$ .

Действительно, выпишем формулы из конструкции п. 2, примененной к какому-то, пока неизвестному, отрезку  $[r', s']$  и определенным выше числам  $a, q, \varepsilon$  и найдем, каким требованиям должны удовлетворять числа  $r'$  и  $s'$ , чтобы этот отрезок реализовывал точку  $\mu$ . Ниже во всех выкладках используем аналогичные п. 2 обозначения, отмечая их штрихами:  $L' = (s' - r') / 2$ ,  $\xi' = (r' + s') / 2$  и  $h' = \sqrt{a^2 r' s' / ((c')^2 + a^2 r' s')}$ . В силу формулы (8), условие, что  $\mu$  – точка максимума функции  $v(\cdot)$ , запишется как  $\mu = \mu_{\max} = \xi' + L' h'$ , а равенство  $v(\mu) = q + \varepsilon$ , с учетом (9), примет вид  $q + \varepsilon = a \xi' + a L' / h'$ . Исключив из второго условия  $h'$  и подставив в первое, получим равенство  $\mu = \xi' + a(L')^2 / (q + \varepsilon - a \xi')$ , откуда найдем  $L' = \sqrt{(\mu - \xi')(q + \varepsilon - a \xi') / a}$ . В силу непрерывности  $L'$  как функции  $\xi'$  можно так выбрать  $\xi' < \mu$ , достаточно близкое к  $\mu$ , что  $L'$ , найденное из последней формулы, будет достаточно малым, а отрезок с концами  $r' = \xi' - L'$  и  $s' = \xi' + L'$  будет удовлетворять нашим требованиям.

Для каждой точки  $\mu$  из отрезка  $\Delta_w^i(k, l)$  построим отрезок  $\Theta(\mu)$ , который ее реализует. В этом отрезке, в свою очередь, выберем подинтервал  $\theta(\mu)$ , на котором функция  $v(\cdot)$  принимает значения из промежутка  $(q, q + \varepsilon]$ . Совокупность всех подинтервалов  $\{\theta(\mu) : \mu \in \Delta_w^i(k, l)\}$  образует открытое покрытие отрезка  $\Delta_w^i(k, l)$ , из которого по лемме Гейне – Бореля выберем конечное подпокрытие:  $\cup_{j=1}^J \theta(\mu_j) \supset \Delta_w^i(k, l)$ . При этом реализующие отрезки  $\Theta(\mu_j)$ ,  $j = 1, \dots, J$ , будем называть основными для отрезка  $\Delta_w^i(k, l)$ .

**3.3.** Прделав эти построения для всех интервалов  $I_w^i(k)$ , получим множество основных отрезков, которые занумеруем одним параметром  $m \in \mathbb{N}$ ; при этом основной отрезок, отвечающий номеру  $m$ , обозначим через  $\Delta(m)$ , ту четверку  $(w, i, k, l)$ , для которой  $\Delta(m)$  является основным (одним из основных) отрезком для  $\Delta_w^i(k, l)$  – через  $o(m)$ , число  $\varepsilon$  – через  $\varepsilon(m)$ , функцию  $v(\mu)$ , построенную, как в подп. 3.2, для  $\Delta(m)$  – через  $v(\mu, m)$ , параметры (6) функции  $v(\mu, m)$  – через  $a(m), b(m), c(m), d(m)$ , а вектор  $(a(m), b(m), c(m), d(m))^T$  – через  $p(m)$ . Компоненты  $w$  и  $i$  четверки  $o(m) = (w, i, k, l)$  будем обозначать  $o_1(m)$  и  $o_2(m)$  соответственно.

Непосредственно из построений вытекают следующие свойства:

i) для каждой точки  $\mu \in I_w^i(k)$  найдется номер  $m \in \mathbb{N}$  такой, что  $v(\mu, m) \in (q_w, q_w + \varepsilon(w, i)]$ , при этом  $o(m) = (w, i, k, l)$  для некоторого  $l \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ;

ii) для каждой точки  $\mu \in I_w^i(k)$  найдется не более, чем конечное количество номеров  $m \in \mathbb{N}$  таких, что  $v(\mu, m) > a(w, i, k, l)\mu$  и  $o(m) = (w, i, k, l)$  при некотором  $l \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  (т. е.  $\mu \in \Delta(m)$  лишь для конечного количества тех  $m$ , для которых  $o(m) = (w, i, k, l)$ );

iii)  $a(m) \rightarrow +\infty$  при  $m \rightarrow +\infty$ .

**4.** Покажем, что из построений п. 3. следует равенство

$$\overline{\lim}_{m \rightarrow +\infty} v(\mu, m) = f(\mu), \quad \mu \in (-\infty, 0). \quad (12)$$

Рассмотрим сначала те номера  $m$ , при которых точка  $\mu$  не принадлежит отрезку  $\Delta(m)$ , занумеруем их по возрастанию и обозначим полученную последовательность номеров через  $(m_s)_{s \in \mathbb{N}}$ .

По построению  $v(\mu, m_s) = a(m_s)\mu$ , следовательно,  $\overline{\lim}_{s \rightarrow +\infty} v(\mu, m_s) = -\infty$ , так как  $\mu < 0$  и, по свойству iii) предыдущего пункта, имеет место соотношение  $\overline{\lim}_{s \rightarrow +\infty} a(m_s) = +\infty$ .

Выберем какую-либо последовательность рациональных чисел  $(q_{w_j})_{j \in \mathbb{N}} \uparrow f(\mu)$ . При всех  $j \in \mathbb{N}$  точка  $\mu$  принадлежит множеству  $[f \geq q_{w_j}]$ , а значит, к ней применимо свойство i) подп. 3.3. Таким образом, найдется последовательность натуральных чисел  $(m_j)_{j \in \mathbb{N}}$ , для которой  $v(\mu, m_j) > q_{w_j}$  при всех  $j \in \mathbb{N}$ . Следовательно, верно неравенство  $\overline{\lim}_{m \rightarrow +\infty} v(\mu, m) \geq f(\mu)$ .

Для завершения доказательства равенства (12) осталось показать, что для любого  $\eta > 0$  существует не более, чем конечное количество номеров  $m$  таких, что

$$v(\mu, m) \geq f(\mu) + \eta. \quad (13)$$

Оценим сверху количество таких  $m$ . Выберем номер  $w \in \mathbb{N}$ , для которого выполнено двойное неравенство  $f(\mu) \leq q_w < f(\mu) + \eta$ . Тогда  $\mu \notin [f \geq q_w]$ , а значит, по лемме из подп. 3.1 точка  $\mu$  может принадлежать лишь конечному количеству множеств  $G_j^k$ , где  $k \in \mathbb{N}$ , а  $q_j > q_w$ . Но каждая точка множества  $G_j^k$  принадлежит по свойству ii) подп. 3.3 не более, чем конечному количеству интервалов  $\Delta(m)$  таких, что  $o_1(m) = j$ ,  $o_2(m) = k$ . Следовательно, при всех  $j \in \mathbb{N}$ , при которых  $q_j > q_w$ , неравенство (13) выполняется не более чем конечное количество раз.

Остались еще номера  $j \in \mathbb{N}$ , для которых  $q_j \leq q_w$ . Начиная с некоторого номера  $N$  все члены последовательности  $(\varepsilon(m))_{m \in \mathbb{N}}$  будут меньше, чем положительное число  $f(\mu) + \eta - q_w$ , а значит, и максимум функции  $v(\cdot, m)$  будет меньше, чем  $f(\mu) + \eta$  при всех  $m \in \mathbb{N}$ , таких, что  $o_1(m) = j$ ,  $m \geq N$ ,  $q_j \leq q_w$ . И в этом случае получили, что неравенство (13) выполняется не более чем конечное количество раз. Равенство (12) доказано.

**5.** Построение матрицы системы будем вести индукцией по шагам, на которых будем, согласно п. 1, строить соответствующие  $2 \times 2$ -матрицу  $B(\cdot)$  и функцию  $\omega(\cdot)$  семейства (4), т. е. матрицу  $S_{B, \omega}(\cdot, \mu)$ . Считаем, что фиксирована возрастающая последовательность  $(T_m)_{m \in \mathbb{N} \cup \{0\}}$ , которую определим позднее; пока же предполагаем только, что она удовлетворяет следующим условиям:  $T_0 = 0$ ,  $\lim_{m \rightarrow +\infty} T_m = +\infty$  и что четыре числа  $T_{3m-3}, T_{3m-2}, T_{3m-1}, T_{3m}$  образуют арифметическую

прогрессию при каждом  $m \in \mathbb{N}$ . На  $m$ -м шаге ( $m \in \mathbb{N}$ ) будем строить матрицу  $C_{B,\omega}$  на полуинтервале  $(T_{3(m-1)}, T_{3m}]$ , при этом, если необходимо, будем изменять ее значения на предыдущем полуинтервале  $(T_{3(m-2)}, T_{3(m-1)})$ . Обозначим  $\tau_m = (T_{m-1}, T_m]$ ,  $m \in \mathbb{N}$ . Пусть сделан  $m-1$  шаг, т. е. матрица  $B(t)$  и функция  $\omega(t)$  определены при всех  $t \in [0, T_{3(m-1)}]$ . Сделаем  $m$ -й шаг.

Зададим пару  $(B(\cdot), \omega(\cdot))$  на полуинтервале  $(T_{3(m-1)}, T_{3m}]$  равенствами

$$\begin{aligned} B(t) &= \begin{pmatrix} a(m) & b(m) \\ d(m) & a(m) \end{pmatrix} \text{ и } \omega(t) = c(m) && \text{при } t \in \tau_{3m-2}, \\ B(t) &= \alpha_m E_2 \text{ и } \omega(t) = 0 && \text{при } t \in \tau_{3m-1}, \\ B(t) &= \begin{pmatrix} -a(m) & -b(m) \\ -d(m) & -a(m) \end{pmatrix} \text{ и } \omega(t) = -c(m) && \text{при } t \in \tau_{3m}. \end{aligned} \quad (14)$$

Последовательность  $(\alpha_m)_{m \in \mathbb{N}}$  определим позднее. Эти построения задают матрицу  $B(\cdot)$  и функцию  $\omega(\cdot)$  при всех  $t \geq 0$ . Матрицу  $C_{B,\omega}(t, \mu)$  семейства (4) с построенными матрицей  $B(t)$  и функцией  $\omega(t)$  обозначим через  $C(t, \mu)$ , через  $\langle \mu \rangle_C$  – систему  $\langle \mu \rangle$  этого семейства, а через  $X_\mu(\cdot, \cdot)$  – матрицу Коши системы  $\langle \mu \rangle_C$ . По построению матрица  $C(\cdot, \cdot)$  кусочно-постоянна на временной полуоси и при всех  $m \in \mathbb{N}$  справедливы равенства  $C(t, \mu) = D(\mu; p(m))$ , если  $t \in \tau_{3m-2}$ ,  $C(t, \mu) = \alpha_m \mu E_2$ , если  $t \in \tau_{3m-1}$ , и  $C(t, \mu) = -D(\mu; p(m))$ , если  $t \in \tau_{3m}$ .

До конца доказательства  $A(\cdot)$  обозначает матрицу, связанную с построенными матрицей  $B(\cdot)$  и функцией  $\omega(\cdot)$  равенством (3), в котором матрица  $B(\cdot)$  и функция  $\omega(\cdot)$  определяются соотношениями (14).

Из определения (14), поскольку на полуинтервалах  $\tau_m$  матрица  $C(\cdot, \cdot)$  постоянна, непосредственно следует, что для матрицы Коши  $X_\mu(\cdot, \cdot)$  системы  $\langle \mu \rangle_C$  справедливы представления

$$X_\mu(t, T_{3m-i}) = \begin{cases} \exp(D(\mu, p(m))(t - T_{3m-3})) & \text{при } i = 3, t \in \tau_{3m-2}, \\ \exp(\alpha_m \mu (t - T_{3m-2})) E_2 & \text{при } i = 2, t \in \tau_{3m-1}, \\ \exp(-D(\mu, p(m))(t - T_{3m-1})) & \text{при } i = 1, t \in \tau_{3m}. \end{cases} \quad (15)$$

Из этих равенств очевидно вытекает  $X_\mu(T_{3m}, T_{3m-3}) = \exp(\alpha_m (T_{3m} - T_{3m-3}) \mu / 3) E_2$ . Обозначим сумму  $\sum_{i=1}^m \alpha_m (T_{3m} - T_{3m-3}) / 3$  через  $s_m$ . Тогда, как нетрудно убедиться, для фундаментальной матрицы  $X_\mu(\cdot, 0)$  при всех  $m \in \mathbb{N}$  верны равенства

$$\begin{aligned} X_\mu(T_{3m}, 0) &= \exp(s_m \mu) E_2, \\ X_\mu(T_{3m+1}, 0) &= \exp(s_m \mu) \exp(D(\mu, p(m+1))(T_{3m+1} - T_{3m})), \\ X_\mu(T_{3m+2}, 0) &= \exp(s_{m+1} \mu) \exp(D(\mu, p(m+1))(T_{3m+1} - T_{3m})). \end{aligned} \quad (16)$$

6. Покажем, что последовательности  $(\alpha_m)_{m \in \mathbb{N}}$  и  $(T_m)_{m \in \mathbb{N}}$  можно задать так, чтобы старший показатель Ляпунова построенного семейства совпадал с функцией  $f(\mu)$  при всех  $\mu \in \mathbb{R}$ , т. е. чтобы при всех  $\mu \in \mathbb{R}$  выполнялось равенство

$$\lambda_2(\mu A) = \overline{\lim}_{m \rightarrow +\infty} v(\mu, m). \quad (17)$$

Рассмотрим вначале точки  $\mu \in (-\infty, 0)$ . Как известно [13, с. 170], старший показатель Ляпунова можно вычислять по формуле  $\lambda_2(\mu A) = \overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \ln \|X_\mu(t, 0)\|$ . Фундаментальная матрица  $X_\mu(t, 0)$  имеет различный вид на полуинтервалах  $\tau_{3m+1}, \tau_{3m+2}, \tau_{3m+3}$  при всех  $m \in \mathbb{N}$ , поэтому рассмотрим отдельно каждый из них.

1) Пусть  $t \in \tau_{3m+1}$ . Тогда из соотношений (15) и (16) следует равенство

$$X_\mu(t, 0) = \exp(s_m \mu) \exp(D(\mu, p(m+1))(t - T_{3m})). \quad (18)$$



Оценим норму матрицы  $\exp(D(\mu; p(m+1))(t - T_{3m}))$ . Согласно [2, с. 131] имеет место неравенство

$$\|\exp(D(\mu; p(m+1))(t - T_{3m}))\| \leq \exp(v(\mu, m+1)(t - T_{3m}))H_{\mu, m+1}(t), \quad (19)$$

где  $H_{\mu, m+1}(t) = 1 + 2(t - T_{3m})\|D(\mu; p(m+1))\|$ . Воспользовавшись (18) и (19), получим, что

$$t^{-1} \ln \|X_{\mu}(t, 0)\| \leq t^{-1}(s_m \mu + v(\mu, m+1)(t - T_{3m}) + \ln H_{\mu, m+1}(t)),$$

откуда, после преобразований, приходим к оценке

$$t^{-1} \ln \|X_{\mu}(t, 0)\| \leq v(\mu, m+1) + (s_m \mu - v(\mu, m+1)T_{3m} + \ln H_{\mu, m+1}(t)) / t. \quad (20)$$

Функция  $(\ln H_{\mu, m+1}(t)) / t$  для каждого  $\mu$ , начиная с некоторого момента времени (своего для каждого  $\mu$ ), убывает и стремится к нулю. Рассмотрим  $\mu \in [-m, -1/m]$ , и пусть  $t_{m+1}(\mu)$  – то число, начиная с которого  $(\ln H_{\mu, m+1}(t)) / t \leq m^{-1}$ . Коэффициенты матрицы  $D(\mu; p(m+1))$  линейно зависят от  $\mu$ , следовательно,  $\|D(\mu; p(m+1))\|$  непрерывно зависит от  $\mu$ , поэтому и  $t_{m+1}(\mu)$  – непрерывная функция аргумента  $\mu$ , а значит, величина

$$M(m+1) = \max_{\mu \in [-m, -1/m]} \max_{t \in [T_{3m}, t_{m+1}(\mu)]} \ln H_{\mu, m+1}(t),$$

конечна; без ограничения общности считаем это число неотрицательным. Число  $\alpha_m$ , выбранное на предыдущем шаге, увеличим при необходимости так, чтобы выполнялось неравенство  $s_m \geq \alpha(m+1) + mM(m+1)$ . Тогда при всех  $\mu \in [-m, -1/m]$  и  $t \in \tau_{3m+1}$  будет верна оценка  $t^{-1} \ln \|X_{\mu}(t, 0)\| \leq v(\mu, m+1) + m^{-1}$ , так как в правой части (20) либо числитель дроби неположителен, либо сама дробь не больше  $m^{-1}$ .

Из представления (18) следует, что  $t^{-1} \ln \|X_{\mu}(t, 0)\| = t^{-1}(s_m \mu + \ln \|D(\mu, p(m+1))(t - T_{3m})\|)$ . Так как матрица  $D(\mu, p(m+1))$  постоянна, то [2, с. 122]  $\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \ln \|D(\mu, p(m+1))(t)\| = v(\mu, m+1)$ . Выберем теперь  $T_{3m+1}$  настолько большим, чтобы при всех  $\mu \in [-m, -1/m]$  на полуинтервале  $\tau_{3m+1}$  нашлась точка  $t'_{3m+1}(\mu)$ , для которой верно неравенство

$$(t'_{3m+1}(\mu))^{-1} (-s_m m + \ln \|D(\mu, p(m+1))(t'_{3m+1}(\mu) - T_{3m})\|) > v(\mu, m+1) - m^{-1}$$

(такое  $T_{3m+1}$  найдется в силу непрерывности функции  $t^{-1} \ln \|D(\mu, p(m+1))(t - T_{3m})\|$  по  $t$  и  $\mu$ , непрерывности  $v(\mu, m+1)$  по  $\mu$  и компактности отрезка  $[-m, -1/m]$ ). При таком выборе при всех  $\mu \in [-m, -1/m]$  справедливо неравенство  $(t'_{3m+1}(\mu))^{-1} \ln \|X_{\mu}(t'_{3m+1}(\mu), 0)\| > v(\mu, m+1) - m^{-1}$ .

Объединяя полученные результаты, получим  $\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \ln \|X(t, 0)\| = \overline{\lim}_{m \rightarrow +\infty} v(\mu, m)$ , где верхний предел в левой части вычисляется только по  $t \in \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \tau_{3m+1}$ .

2) Пусть  $t \in \tau_{3m+2}$ . Тогда из соотношений (15) и (16) получаем, что

$$X_{\mu}(t, 0) = \exp(D(\mu, p(m+1))(T_{3m+1} - T_{3m})) \exp((s_m + \alpha_{m+1}(t - T_{3m+1}))\mu). \quad (21)$$

Обозначим  $(T_{3m+1})^{-1} \ln \|X_{\mu}(T_{3m+1}, 0)\|$  через  $N(\mu, m)$ , тогда из (21) следует равенство

$$t^{-1} \ln \|X_{\mu}(t, 0)\| = t^{-1}(N(\mu, m)T_{3m+1} + \alpha_{m+1}\mu(t - T_{3m+1})) = \alpha_{m+1}\mu + (N(\mu, m) - \alpha_{m+1}\mu)T_{3m+1} / t.$$

В зависимости от знака величины  $N(\mu, m) - \alpha_{m+1}\mu$  это выражение принимает наибольшее значение в одной из крайних точек полуинтервала  $\tau_{3m+2}$ . Выберем  $\alpha_{m+1}$  достаточно большим, чтобы при всех  $\mu \in [-m, -1/m]$  выполнялось неравенство  $N(\mu, m) \geq \alpha_{m+1}\mu$ . Такое положительное  $\alpha_{m+1}$

найдется, так как функция  $(T_{3m+1})^{-1} \ln \|X_\mu(T_{3m+1}, 0)\|$  аргумента  $\mu$  непрерывна на компакте  $[-m, -1/m]$ , а значит, принимает на нем свое минимальное значение. Тогда максимум функции  $t^{-1} \ln \|X_\mu(t, 0)\|$  будет достигаться в точке  $T_{3m+1}$ , но, как показано в случае 1),  $(T_{3m+1})^{-1} \ln \|X_\mu(T_{3m+1}, 0)\| \leq v(\mu, m+1) + m^{-1}$ . Отметим, что, так как в этом случае нам было достаточно только оценки на  $\alpha_{m+1}$  снизу, то эти рассуждения останутся верными, если на следующем шаге в случае 1) величина  $\alpha_{m+1}$  увеличится.

3) Пусть  $t$  принадлежит  $\tau_{3m+3}$ . Тогда из соотношений (15) и (16) следует, что

$$X_\mu(t, 0) = \exp(s_{m+1}\mu) \exp(D(\mu, p(m+1))(T_{3m+1} - T_{3m})) \exp(-D(\mu, p(m+1))(t - T_{3m+2})).$$

Поскольку матрицы  $D(\mu, p(m+1))$  и  $-D(\mu, p(m+1))$  перестановочны, то последнее равенство можно переписать в виде

$$X_\mu(t, 0) = \exp(s_{m+1}\mu) \exp(D(\mu, p(m+1))(T_{3m+3} - t)). \quad (22)$$

Как и в случае 1), запишем неравенство, аналогичное неравенству (19):

$$\|\exp(D(\mu; p(m+1))(T_{3m+3} - t))\| \leq \exp(v(\mu, m+1)(T_{3m} - t)) \tilde{H}_{\mu, m+1}(t),$$

где  $\tilde{H}_{\mu, m+1}(t) = 1 + 2(T_{3m+3} - t) \|D(\mu; p(m+1))\|$ . Следовательно,

$$t^{-1} \ln \|X_\mu(t, 0)\| \leq t^{-1} (s_{m+1}\mu + v(\mu, m+1)(T_{3m+3} - t) + \ln \tilde{H}_{\mu, m+1}(t)),$$

откуда после преобразований получаем оценку

$$t^{-1} \ln \|X_\mu(t, 0)\| \leq -v(\mu, m+1) + (s_{m+1}\mu + v(\mu, m+1)T_{3m+3} + \ln \tilde{H}_{\mu, m+1}(t)) / t. \quad (23)$$

При  $\mu \in [-m, -1/m]$ ,  $t \in [T_{3m+2}, T_{3m+3}]$  сумма  $v(\mu, m+1)T_{3m+3} + \ln \tilde{H}_{\mu, m+1}(t)$  ограничена, поэтому выберем  $\alpha_{m+1}$  настолько большим, чтобы числитель дроби в правой части неравенства (23) был отрицательным, тогда правая часть оценки (23) растёт при увеличении  $t$  и достигает своего максимума при  $t = T_{3m+3}$ , при котором правая часть равна  $s_{m+1}\mu / T_{3m+3}$ . При необходимости увеличим  $\alpha_{m+1}$  так, чтобы  $s_{m+1} / T_{3m+3} > m$ , тогда  $\overline{\lim}_{m \rightarrow +\infty} s_{m+1}\mu / T_{3m+3} = -\infty$ , и, следовательно,  $\overline{\lim}_{t \rightarrow +\infty} t^{-1} \ln \|X_\mu(t, 0)\| = -\infty$ , где верхний предел в левой части вычисляется только по  $t \in \bigcup_{m \in \mathbb{N}} \tau_{3m+3}$ . Как и в случае 2), при рассмотрении случая 3) мы пользовались только оценками снизу на  $\alpha_{m+1}$  и  $s_{m+1}$ , а значит, эти рассуждения останутся верным, если на следующем шаге в случае 1) величина  $\alpha_{m+1}$  увеличится.

На  $m$ -м шаге рассуждения велись для  $\mu \in [-m, -1/m]$ , но так как  $m \rightarrow +\infty$ , то для каждого фиксированного  $\mu$  они будут верны, начиная с номера  $m = \max\{[-\mu], [-\mu^{-1}]\} + 1$ . Таким образом, равенство (17) доказано для всех  $\mu < 0$ .

Очевидно, что старший показатель Ляпунова построенного семейства равен нулю при  $\mu = 0$ , так как в этом случае матрица  $C_{B, \omega}(t, 0) \equiv 0$  и матрица Коши  $X_0(t, 0) \equiv E_2$ . Рассмотрим теперь произвольное  $\mu > 0$ . Из первого равенства в (16) следует, что  $(T_{3m})^{-1} \ln \|X_\mu(T_{3m}, 0)\| = \mu s_m / T_{3m} \rightarrow +\infty$  при  $m \rightarrow +\infty$ , и, значит,  $\lambda_2(\mu A) = +\infty$  при любом  $\mu > 0$ . Таким образом, равенство  $\lambda_2(\mu A) = f(\mu)$  доказано для всех  $\mu \in \mathbb{R}$ .

7. Отметим, что, как и в работе [9], матрицу системы, удовлетворяющей условиям теоремы 1, можно сделать бесконечно дифференцируемой. Построение бесконечно дифференцируемой системы аналогично построению из [9, п. 3.5]. Необходимо только учесть, что параметров теперь пять, а не три, и взять функцию  $g(t)$  из [9] равной  $g(t) = \max(|a|, |b - c|, |d + c|, |c|, s_m)$ , а все остальные построения оставить без изменений.

Теорема в случае  $n = 2$  доказана. Для доказательства ее в случае  $n > 2$  достаточно в качестве матрицы коэффициентов системы рассмотреть  $n \times n$ -матрицу  $\text{diag}[A(t), t, \dots, t]$ , где  $A(t)$  – построенная выше  $2 \times 2$  матрица. Теорема 1 доказана.

**З а м е ч а н и е.** В доказательстве подп. 3.4 теоремы 2 из [9] для того, чтобы показатель  $\lambda_2(\mu A)$  равнялся верхнему пределу при  $t \rightarrow +\infty$  величин  $v_2(\mu; k)(t - T_k)/t$ ,  $t \in [T_k, T_k']$ , к условию  $T_k' / T_k \rightarrow +\infty$  при  $k \rightarrow +\infty$  нужно добавить одно дополнительное условие, аналогично тому, как сделано в настоящей работе. Именно, обозначим через  $t_k(\mu)$  такое число, что при всех  $t \geq t_k(\mu)$  выполняется неравенство  $\ln \|\exp(D(\mu; p(k))t)\| / t \leq v_2(\mu; k) + k^{-1}$  (не ограничивая общности, считаем  $t_k(\mu)$  непрерывной функцией переменной  $\mu$ ). Пусть  $M_k = \max \{\ln \|\exp(D(\mu; p(k))t)\| / t : \mu \in [k^{-1}, k], t \in (0, t_k(\mu))\}$ ; эта величина конечна, так как  $t_k(\mu)$  непрерывно зависит от  $\mu$ , норма  $\|\exp(D(\mu; p(k))t)\|$  непрерывно зависит от  $\mu$  и  $t$ , а предел  $\lim_{t \rightarrow 0} \ln \|\exp(D(\mu; p(k))t)\| / t$  конечен. Осталось выбрать число  $T_k$  таким, чтобы выполнялось неравенство  $T_k > kM_k \max \{t_k(\mu) : \mu \in [k^{-1}, k]\}$ .

Объединяя доказанную теорему 1 с теоремами 3 и 4 работы [9], получаем полное описание старшего показателя Ляпунова линейной дифференциальной системы с параметром-множителем как функции параметра – его дает основная

**Т е о р е м а 2.** Для каждого натурального  $n \geq 2$  функция  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  тогда и только тогда является старшим показателем Ляпунова некоторого семейства из  $\mathcal{K}_n^*$ , когда она удовлетворяет следующим четырем условиям: 1) принадлежит классу  $(*, G_\delta)$ ; 2) обращается в нуль в нуль; 3) принимает на одной из числовых полуосей только неотрицательные значения; 4) если функция  $f$  не равна тождественно  $+\infty$  ни на одной из открытых полуосей, то существует  $b \in \mathbb{R}$ , такое, что  $f(\mu) \geq b\mu$  при всех  $\mu \in \mathbb{R}$ .

**Следствия из основной теоремы.** Напомним, что множеством  $Se_A$  экспоненциальной устойчивости семейства (2) называется множество тех  $\mu$ , при которых система  $\langle \mu \rangle_A$  экспоненциально устойчива. В работах [14] и [15] доказано, что множество  $Se_A$  экспоненциальной устойчивости семейства (2) с ограниченной на полуоси матрицей коэффициентов  $A(\cdot)$  является  $F_\sigma$ -множеством, лежащим на одной из открытых полуосей. В [15] показано также, что для таких семейств множество  $Se_A$  удовлетворяет еще и другим необходимым условиям. Вопрос о достаточности полученных в [15] условий остается открытым (в [15] получено лишь частичное их обращение). Вместе с тем для семейств из  $\mathcal{K}_n^*$  теоремы 1 и 2 позволяют дать полное описание множеств  $Se_A$ ,  $A \in \mathcal{M}_n^*$ .

**С л е д с т в и е 1.** Для каждого натурального  $n \geq 2$  множество  $M \subset \mathbb{R}$  тогда и только тогда является множеством экспоненциальной устойчивости  $Se_A$  некоторого семейства из  $\mathcal{K}_n^*$ , когда оно является  $F_\sigma$ -множеством, лежащим на одной из открытых полуосей.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Необходимость следует из теоремы 2, поскольку множество экспоненциальной устойчивости – это множество  $[\lambda_n < 0]$ , которое, как дополнение к  $G_\delta$ -множеству  $[\lambda_n \geq 0]$ , является  $F_\sigma$ -множеством. Множество  $[\lambda_n < 0]$  в силу условия 3) теоремы 2 лежит на одной из открытых полуосей. Необходимость доказана. Докажем достаточность. Пусть дано множество  $M$  типа  $F_\sigma$ , лежащее на одной из открытых полуосей (обозначим эту полуось через  $s$ ). Зададим функцию  $f : \mathbb{R} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$  следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{при } x \in M, \\ 0 & \text{при } x \in (s \setminus M) \cup \{0\}, \\ +\infty & \text{при } x \in \mathbb{R} \setminus (s \cup \{0\}). \end{cases}$$

Для завершения доказательства остается применить к функции  $f$  теорему 1.

Множество значений старшего показателя Ляпунова  $\lambda_n(\mu A)$  семейств из  $\mathcal{K}_n^*$  описывает

**С л е д с т в и е 2.** Множество  $M \subset \mathbb{R}$  тогда и только тогда является множеством значений старшего показателя Ляпунова  $\lambda_n(\mu A)$  некоторого семейства из  $\mathcal{K}_n^*$ , когда оно является суслинским множеством, содержащим нуль.

**Д о к а з а т е л ь с т в о.** Поскольку, согласно лемме 2, функция  $\lambda_n(\mu A)$  переменной  $\mu \in \mathbb{R}$  – функция класса  $(*, G_\delta)$ , то она является бэровской функцией, а значит, множество ее значений – суслинское множество [7, с. 255]. В силу условия 2) теоремы 2 оно содержит нуль. Необходимость

доказана. Докажем достаточность. Так как  $M$  – суслинское множество расширенной числовой прямой  $\overline{\mathbb{R}}$ , а ограничивающее отображение  $\ell$  – гомеоморфизм, то  $\ell(M)$  – суслинское множество прямой  $\mathbb{R}$ . Поэтому [7, с. 256] существует функция первого бэровского класса  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  (и даже полунепрерывная функция [16, 17]), для которой  $\varphi(\mathbb{R}) = \ell(M)$ . Тогда  $\psi = \ell^{-1} \circ \varphi \circ \ln$  – функция первого бэровского класса  $(0, +\infty) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ , множество значений которой совпадает с множеством  $M$ . Следовательно, функция  $f$ , определяемая соотношениями

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \in (-\infty, 0], \\ \psi(x) & \text{при } x \in (0, +\infty), \end{cases}$$

удовлетворяет всем условиям теоремы 2. Осталось воспользоваться теоремой 2.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Е. А. Барабанову за постановку задачи и внимание, проявленное к работе.

### Список использованной литературы

1. *Ляпунов, А. М.* Собрание сочинений: в 6 т. / А. М. Ляпунов. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954–1959. – Т. 2. – 1956.
2. Теория показателей Ляпунова и ее приложения к вопросам устойчивости / Б. Ф. Былов [и др.]. – М.: Наука, 1966.
3. *Изобов, Н. А.* О существовании линейной сингулярной системы с неограниченным по мере экспоненциальным характеристическим множеством / Н. А. Изобов, С. Г. Красовский // Дифференц. уравнения. – 1998. – Т. 34, № 8. – С. 1049–1055.
4. *Красовский, С. Г.* О спектральных характеристических сигма-множествах четной размерности и положительной меры / С. Г. Красовский // Дифференц. уравнения. – 2008. – Т. 44, № 6. – С. 856–857.
5. *Красовский, С. Г.* Критерий инвариантности характеристических показателей линейных систем с малым параметром при производной / С. Г. Красовский // Дифференц. уравнения. – 2003. – Т. 39, № 10. – С. 1315–1324.
6. *Зубов, В. И.* Колебания и волны / В. И. Зубов. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1989.
7. *Хаусдорф, Ф.* Теория множеств / Ф. Хаусдорф. – М.; Л.: ОНТИ, 1937.
8. *Куратовский, К.* Топология: в 2 т. / К. Куратовский. – М.: Мир, 1966–1969. – Т. 1. – 1966.
9. *Карпук, М. В.* О старшем показателе Ляпунова линейной дифференциальной системы с параметром-множителем при производной как функции параметра / М. В. Карпук // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2014. – № 4. – С. 15–24.
10. *Барабанов, Е. А.* О множествах неправильности семейств линейных дифференциальных систем / Е. А. Барабанов // Дифференц. уравнения. – 2009. – Т. 45, № 8. – С. 1067–1084.
11. *Барабанов, Е. А.* Строение множеств устойчивости и асимптотической устойчивости семейств линейных дифференциальных систем с параметром-множителем при производной. I / Е. А. Барабанов // Дифференц. уравнения. – 2010. – Т. 46, № 5. – С. 611–625.
12. *Карпук, М. В.* Показатели Ляпунова семейств метризованных векторных расслоений как функции на базе расслоения / М. В. Карпук // Дифференц. уравнения. – 2014. – Т. 50, № 10. – С. 1332–1338.
13. *Далецкий, Ю. Л.* Устойчивость решений дифференциальных уравнений в банаховом пространстве / Ю. Л. Далецкий, М. Г. Крейн. – М.: Мир, 1970.
14. *Барабанов, Е. А.* Множества правильности и устойчивости однопараметрических семейств линейных дифференциальных систем / Е. А. Барабанов, А. Ф. Касабуцкий // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2009. – № 4. – С. 67–75.
15. *Касабуцкий, А. Ф.* О множествах Лебега показателя экспоненциальной устойчивости линейных дифференциальных систем с параметром / А. Ф. Касабуцкий // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. фіз.-мат. навук. – 2010. – № 4. – С. 58–67.
16. *Барабанов, Е. А.* Структура множества нижних показателей Перрона линейной дифференциальной системы / Е. А. Барабанов // Дифференц. уравнения. – 1986. – Т. 22, № 11. – С. 1843–1853.
17. *Барабанов, Е. А.* Строение множества характеристических показателей Ляпунова экспоненциально устойчивых квазилинейных систем / Е. А. Барабанов, И. А. Волков // Дифференц. уравнения. – 1994. – Т. 30, № 1. – С. 3–19.

Поступила в редакцию 22.07.2015